


CHEMISEPT HF COLOR

Kloorheksidiini ja värvainega naha antiseptikum

- sisaldab 2% kloorheksidiini
- pikaajaline antimikroobne toime



Chemisept HF Color on etanooli baasil kloorheksidiini sisaldav värvainega vahend naha preoperatiivseks antiseptikaks ja teisteks kirurgilisteks protseduurideks. Chemisept HF Color on laia bakteritsiidse (k.a. MRSA), mükobakteritsiidse (k.a. Mycobacterium avium and Mycobacterium terrae), fungitsiidse ja virutsiidse (k.a. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia and Rota) toimega.

Tootes **Chemisept HF Color** on kasutatud puhast ja vähelenduvat etüülalkoholi, vältimaks respiratoorsete allergeoside teket. Peale naha antiseptikat jääb tänu tootes sisalduvale kloorheksidiinile püsima pikaajaline mikroobide elutegevuseks sobimatu keskkond. Toimeaja möödudes taastub kiiresti naha normaalne mikrofloora.

KASUTUSVALDKOND:

Kasutatakse peamiselt haiglates ning teistes meditsiini-asutustes

- Naha antiseptika enne kirurgilisi protseduure
- Preoperatiivne naha antiseptika
- Kanüülide ning kateetrite paigaldamisel

KASUTAMINE:

Preoperatiivne naha ettevalmistus:

Operatsiooni piirkond töödelda CHEMISEPT HF COLOR -ga. Selleks kasutada korntange ja steriilset tampooni, mis immutatakse vahendiga ja kantakse nahale korralikult laiali hõõrudes. Operatsioonipiirkonna antiseptika viia läbi kaks korda, mõlemal korral toimeaeg 1,5 min. Lahuse toimeaeg naha preoperatiivseks ettevalmistamiseks kokku 3 minutit. Intsisioonikile võib kleepida ainult kuivale nahale.

Aseptilise operatsiooni korral alustada antiseptikat planeeritava löike piirkonnast, liikudes edasi perifeeria suunas.

Septilise operatsiooni korral alustada naha antiseptikaga perifeeriast, liikudes septilise piirkonna suunas.

Intraartikulaarse injektsiooni, punktsiooni, artroskoopia ja kanüleerimise eelne naha antiseptika:

Niisutada süstimisriba või tampoon tootega ning töödelda nahka operatsiooniala piirkonnas, korrata toimingut teistkordselt uue tampooniga, kokku 30 sekundit

MIKROBIOLOOGIA:

Mikroorganism	Konsentratsioon	Toimeaeg
Escherichia coli	lahjendamata	30 sek
Staphylococcus aureus	lahjendamata	30 sek
Pseudomonas aeruginosa	lahjendamata	30 sek
Enterococcus hirae	lahjendamata	30 sek
MRSA	lahjendamata	30 sek
Candida albicans	lahjendamata	30 sek
Mycobacterium terrae	lahjendamata	30 sek
Mycobacterium avium	lahjendamata	30 sek
Vaccinia	lahjendamata	30 sek
BVDV	lahjendamata	30 sek
Rota	lahjendamata	60 sek

Toode vastab **EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 12791, EN 1500** nõutele.

KOOSTIS:

100g toodet sisaldab toimeaineid: etanool 70 g, D-glükoonhappe ja N,N-bis (4-klorofenüül)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraasetetradekaandiamidiini ühend (2:1) (CHDG) 2g

ETTEVAATUSABINÕUD:


Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga!
Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest.
Mitte suitsetada.

Hoida pakend tihedalt suletuna.


SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.

PACKAGING:



1000 ml dosaatorpudel
korgiga



5000 ml
kanister



AS Chemi-Pharm
Tänassilma tee 11, Saku vald 76406, Eesti
www.chemi-pharm.com
chemi-pharm@chemi-pharm.com

Prepared by Maris Millner 19.09.2019
Updated: 08.03.2021